


Verabreichung von Sileo®


Tragen Sie bei der Handhabung des Tierarzneimittels und der Applikations-spritze undurchlässige Einweghandschuhe.

Ring drehen




Halten Sie die Applikationsspritze so, dass Sie die Punktmarkierungen auf dem Kolben sehen können. Halten Sie den Kolben und drehen Sie den Ring in Richtung des Spritzenzylinders, um die verordnete Dosis auszuwählen. Nicht am Kolben ziehen!

Einstellen der Dosis



Positionieren Sie den Dosiererring so, dass die Seite, die dem Spritzenzylinder am nächsten ist, auf einer Ebene mit einem Teilstrich (schwarze Linie) liegt und die gewünschte Anzahl an Punkten zwischen Dosiererring und Spritzenzylinder zu sehen ist (in Gelb dargestellt).

Kappe abziehen



Ziehen Sie kräftig an der Kappe und halten Sie dabei den Spritzenzylinder fest. Hinweis: Die Kappe sitzt sehr fest (ziehen, nicht drehen). Bewahren Sie die Kappe auf.

Dosierung in der Backentasche



Platzieren Sie die Spitze der Applikationsspritze zwischen Lefze und Zahnfleisch des Hundes und drücken Sie auf den Kolben, bis der Dosiererring den Kolben aufhält.

Nicht schlucken



WICHTIG: Das Gel sollte nicht geschluckt werden. Wenn das Gel geschluckt wird, kann es sein, dass es nicht wirkt. **Keine Leckerlis, Futter oder Wasser** innerhalb von 15 Minuten nach der Verabreichung (um die Aufnahme des Wirkstoffs zu ermöglichen).

- Setzen Sie die Kappe wieder auf und legen Sie die Applikationsspritze zurück in die Verpackung, um sie vor Licht zu schützen.
- Die Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen beträgt vier Wochen.
- Bei Raumtemperatur lagern.
- Das Produkt sollte zu jeder Zeit außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Sileo®

Ecuphar
An Animalcare Company

Zur Linderung akuter Geräuschangst bei Hunden



Geräusche lassen mich völlig cool

Stressfrei durch alle Jahreszeiten



Ihrem Hund wurde Sileo® zur Linderung von akuten Geräuschängsten verschrieben.

Ihr Hund

wiegt kg. Die Dosis für Ihren

Hund beträgt Punkte.

Wenn's knallt...

Extreme Verhaltensreaktionen auf Geräusche schaden dem Wohl des Hundes und sind auch für Tierhalter:innen mit enormem Stress verbunden. Etwa 50 Prozent der Hunde zeigen Angstverhalten auf bestimmte Geräusche*. Für Hunde mit Geräuschangst sind nicht nur Silvesterböller und Gewitter furchtbar, sondern die alltäglichen Lärmquellen vom Staubsauger über laute Musik bis hin zum fahrenden Auto sind Angstauslöser, die unbehandelt das Angstverhalten verschlimmern.

Hier kann Sileo® helfen.

Sileo® ist ein Gel für Hunde zum Auftragen auf die Maulschleimhaut mit dem Wirkstoff Dexmedetomidin, welcher eine angstlösende Wirkung hat. Sileo® reduziert den Stress Ihres Hundes und hilft ihm, sich zu beruhigen, indem es der Erregung entgegenwirkt.

Wann ist Sileo® zu verabreichen: Die erste Dosis sollte verabreicht werden, sobald Ihr Hund die ersten Anzeichen von Angst zeigt oder wenn Sie als Besitzer:in einen typischen Reiz (z. B. Feuerwerk oder Donner) wahrnehmen, der bei Ihrem Hund Angst hervorruft. **Die Wirkung tritt innerhalb von 15 bis 60 Minuten ein.**

Wenn das angstausslösende Ereignis anhält und Ihr Hund erneut Anzeichen von Angst zeigt, kann die Gabe von Sileo® **zwei Stunden** nach der letzten Gabe wiederholt werden. Das Produkt kann **bei Bedarf innerhalb von 24 Stunden bis zu fünfmal** verabreicht werden.


Befolgen Sie immer den Rat Ihres Tierarztes /Ihrer Tierärztin und lesen Sie auch die Packungsbeilage.



Dosierungstabelle

Indikation: zur Linderung akuter Angst und Furcht vor Geräuschen

Die Anzahl der Dosierpunkte ist der Tabelle zu entnehmen.



Körpergewicht des Hundes (in kg)	Anzahl der Dosierpunkte	Anzahl möglicher Dosen je Applikator
2,0 – 5,5	1 .	12
5,6 – 12,0	2 ..	6
12,1 – 20,0	3 ...	4
20,1 – 29,0	4	3
29,1 – 39,0	5	2
39,1 – 50,0	6	2
50,1 – 62,5	7	1
62,6 – 75,5	8	1
75,6 – 89,0	9	1
89,1 – 100,0	10	1

BITTE BEACHTEN: Bei einer Einzeldosis von mehr als 6 Punkten sollte die Menge auf beide Seiten des Mauls aufgeteilt werden.

* Blackwell EJ, et al. (2013) Fear responses to noises in domestic dogs: Prevalence, risk factors and co-occurrence with other fear related behaviour. Appl Anim Behav Sci. 145 (1-2): 15-25

Pflichttext



Sehen Sie hier,
wie Sileo verabreicht wird:
www.sileodosing.com/de

